

VACCINATIES:

Informatie en kinesiologicalische testmogelijkheden

Vaccinaties kunnen het immuunsysteem schaden. Zowel vaccinaties in de kindertijd als vaccinaties die gegeven worden in relatie tot reizen. Ook griepvaccinaties kunnen schaden.

Ik heb het vroeger thuis aan den lijve ondervonden toen mijn jongste broertje na een vaccinatie hersenvliesontsteking kreeg. Enkele jaren later is hij aan de gevolgen daarvan overleden. "Kon niet" zeiden de artsen destijds tegen mijn ouders. Mijn ouders hebben lang tevergeefs strijd geleverd met de artsen om hen te wijzen op de gewijzigde gezondheidstoestand van mijn broertje na de vaccinatie. Niemand wist er raad mee. Simpelweg omdat men het probleem niet onderkende of wilde onderkennen. Ik heb als kind waargenomen dat mijn broertje de dag na de vaccinatie ernstig afwezig raakte en wazig reageerde. Ik merkte dat ik geen contact meer met hem kreeg. Ik had het gevoel dat hij mij ging verlaten. Al kon ik wat ik voelde nog niet precies benoemen, ik voelde dat er iets helemaal mis aan het gaan was. Mijn verdriet was groot. Als ik het nu opschrijf, voel ik het nog.

Vaccinatieschade is soms wel en soms niet direct merkbaar. Kenmerken zijn gezondheidsproblemen die zich voordoen direct na vaccinaties tot en met enkele maanden na de vaccinatie. Enkele van die kenmerken zijn: koorts, een lammlendig gevoel, darmproblemen, een grieperig gevoel, zwellingen rond de entingsplaats, abnormale huilbuien, angsten, groeistoornissen, verkoudheid, slaapproblemen, stijfheid, overdreven rustig gedrag, verandering van karakter, gedragsproblemen.

Allerlei klachten in het immuunsysteem op latere leeftijd zouden ook wel eens te maken kunnen hebben met vaccinatieschade. Te denken valt o.a. aan: autisme, ADHD, concentratiestoornissen, slaapproblemen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen.

De hoofdbestanddelen van vaccins zijn de antigenen en de oplosvloeistof. De antigenen zijn de deeltjes waartegen ons lichaam verondersteld wordt immuniteit op te bouwen. Daarnaast bevatten de meeste vaccins ook nog toegevoegde stoffen: additieven, deze kunnen verschillende bedoelingen hebben. Ofwel ze dienen om de vloeistof vrij te houden van bacteriële infecties, ofwel ze zijn bedoeld om de werkzaamheid van het vaccin te vergroten. Vaak zijn deze additieven op zichzelf giftig, of kunnen ze allergische reacties veroorzaken. Additieven die we geregeld terugvinden in vaccins zijn: neomycine, streptomycine, tetracyclines, polymyxine B, kwik (thiomersal), Aluminiumhydroxide, Aluminiumfos-

faat, 2-phenoxyethanol, medium 199 en squalen. Daarnaast bevatten vaccins soms producten die er helemaal niet in thuis horen, zoals virussen. Deze kunnen afkomstig zijn van de kweekbodems waarop de virussen geteeld zijn, zoals apeniercellen of menselijke foetuscellen of kankercellen. Ook formol, gebruikt voor het doden van de kiemen, wordt in vaccins teruggevonden.

De bedoeling van een vaccin is de specifieke weerstand tegen één bepaalde ziekte te verhogen vóór de patiënt er daadwerkelijk mee in contact komt. Het combineren van vaccins maakt de kans op schade groter omdat de toegediende mix ook een moeilijk herkenbare mix van bijwerkingen veroorzaakt.

Het behandelen van vaccinatieschade behoort niet op de eerste plaats tot het werkterrein van een kinesioloog, maar van een daartoe deskundig medicus. Als kinesioloog kunnen we ondersteuning bieden in het proces en samenwerken met de arts. Een kinesioloog kan wel testen of er sprake zou kunnen zijn van vaccinatieschade en een gedeeltelijke correctie hierop maken.

Om uit te testen of er vaccinatieschade is, kan het onderstaande behulpzaam zijn.

Vraag aan de testpersoon om zijn vaccinatieboekje of vaccinatiekaart mee te brengen; de meeste mensen zijn in het bezit hiervan.

Vraag ook aan de testpersoon om op te schrijven wanneer er vaccinaties hebben plaatsgevonden voor reizen of voor andere doeleinden zoals voor het voorkomen van griep. Vraag tenslotte wanneer er operaties, ingrepen met verdovingen en antibioticakuren hebben plaatsgevonden.

Van dienst kunnen zijn bij de testen: de testdoos met de naam "The Blackbox" van Metabolics (<http://www.metabolics.uk>) waar je testbuisjes met bacteriën, schimmels, virussen, chemicaliën, etc. aantreft, plus de bijbehorende remedies. Ook de vier testdozen met de naam "Nosoden" van Nora Wulf (<http://www.totaalbalans.nl>) zijn prima te gebruiken. Testdozen waarmee je hersenfuncties kunt testen zijn ook handig in dit verband. Verder allerlei testdozen met homeopathische middelen in hoge potenties. Om de hierna volgende testprocedure te laten slagen, is het nodig om het homeopathische middel Thuja C30 (4 gram granules Homeoden-Heel, te bestellen bij de groothandel of apotheek) bij de hand te hebben.

Testprocedure om na te gaan of er vaccinatieschade is :

Uitgaande van een clear circuit en de nodige voortesten met bijbehorende noodzakelijke correcties:

- Test GV 20. Deze moet sterk testen.
- Noem hardop alle gegevens (een voor een) uit het inentingsboekje of van de vaccinatiekaart; vermeldt data en soort vaccinatie. Zet deze gegevens in de pauselock.
- Noem hardop andere vaccinaties en wanneer die (ongeveer) er zijn geweest en zet deze gegevens in de pauselock.
- Vraag of er antibioticakuren zijn geweest. De informatie hiervan vermengt zich soms met de informatie van de vaccins. Zet in de pauselock.
- Hetzelfde geldt voor stoffen die toegediend zijn bij operaties en verdovingen. In de pauselock zetten.
- Test nogmaals GV 20. Deze moet nu zwak testen.
- Houd het buisje met Thuja C 30 boven GV 20. Zet dit in de pauselock. Als er nu een sterke test is, kun je ervan uitgaan dat er vaccinatieschade is. Thuja kan de gevolgen van vaccinaties voor een deel elimineren. Als testbuisje in deze procedure om vaccinatieschade te vinden is het prima bruikbaar. Na het testen met het buisje Thuja C 30 boven GV 20, dit testbuisje verwijderen; niet laten liggen boven GV 20.
- Zoek de tijd waarop de eerste vaccinatieschade is ontstaan in de testpersoon door terug te testen in de tijd. Wees niet verbaasd wanneer dit generaties terug is. Het systeem van de testpersoon is daardoor in het heden extra gevoelig geworden voor vaccinatieschade. Ik ben dit regelmatig tegengekomen
- Vraag hardop: "Welke meridianen hebben nadelige gevolgen ondervonden van de vaccinaties?" Test de vijf elementen en stel vast welke meridianen nadelig zijn beïnvloed door de vaccinaties. Zet in de pauselock.
- Vraag hardop welke organen negatief zijn beïnvloed door de vaccinaties. Test de alarmpunten en stel de onbalansen vast. Zet in de pauselock.
- Als je beschikt over kennis van Brain (Richard Utt) of andere procedures om hersenfuncties te testen, stel dan vast welke hersenfuncties nadelig zijn beïnvloed door de vaccinaties. In de pauselock zetten. Testdozen kunnen hier assistentie verlenen.
- Test uit welke emoties er bij de testpersoon onder de gevolgen van vaccinaties spelen. Gebruik ook de lijst van oerangsten (o.a. van Kick Brackmann). Zet de gevonden emoties en angsten in de pauselock. Wees niet verbaasd wanneer je emoties en of angsten vindt die

ogenschijnlijk niets met vaccinaties te maken hebben. Ook pijngedragingen kunnen een rol spelen.

- Als je "Neurotransmissie" van Chris Smith hebt gevolgd, zoek dan uit welke neurotransmitters verstoord zijn door de vaccinaties. Gegevens die je vindt in de pauselock zetten.
- Test specifiek uit welke zware metalen in het lichaam van de testpersoon aanwezig zijn als gevolg van vaccinatieschade. Zet wat je vindt in de pauselock.
- Neutraliseer daarna volgens de procedures en werkmethodes die je geleerd hebt. Ik ben meer voor het woord neutraliseren dan voor het woord corrigeren.
- Cranio-sacrale correcties zijn onmisbaar bij het neutraliseren van vaccinatieschade.
- Zoek uit welke preparaten en homeopathische middelen (uitsluitend wanneer je er degelijke kennis van hebt) ondersteunend kunnen werken om de vaccinatieschade te neutraliseren. Denk aan Q10, omega, zink, magnesium, foliumzuur, pyridoxaal-5-fosfaat, cysteïne, mangaan, selenium, chorella, silymarin, ionisch zilver, multivitaminen, etc. De eerder genoemde "Blackbox" doet hier uitstekend dienst. Vergeet de waterhuishouding niet.
- Test uit of er wat veranderd dient te worden aan de voeding. Vaak vond ik histamine-arme voeding als noodzaak. Het eten van varkensvlees kwam ik telkens tegen als zeer schadelijk bij vaccinatieschade.
- Wanneer er volledig is geneutraliseerd, zal het testbuisje Thuja C30 boven GV 20 zwak testen.
- Adviseer tenslotte de testpersoon contact op te nemen met een gespecialiseerd (homeopathisch) arts om verder ondersteuning te krijgen in het opruimen van vaccinatieschade. Het is nodig om homeopathische verdunningen in te nemen van de versturende vaccins (<http://www.tinus-smits.nl>). Er is ook hier weer een prachtige samenwerking te creëren tussen de kinesioloog en het reguliere circuit.

Uit bovenstaande mag niet de conclusie worden getrokken dat vaccineren achterwege dient te worden gelaten. Een juiste afweging maken, samen met een arts, die deskundig is op het gebied van vaccinatieschade, is op zijn plaats.

Victor Backus, kinesioloog.

Reacties naar e-mail: azuleen@euronet.nl

